

大阪府における環境および食品中放射能調査 (平成 26 年度報告)

東 恵美子* 肥塚 利江*
足立 伸一*

平成 26 年度の原子力規制庁委託により実施した大阪府における環境および各種食品中放射能調査結果を報告する。調査は、降水中の全ベータ放射能測定、環境試料（降下物、大気浮遊じん、上水、海水、土壌、海底土）および各種食品試料中のガンマ線放出核種分析および空間放射線量率（モニタリングポスト）について実施した。

また、平成 22 年度より行っている福島第 1 原子力発電所の事故を受けたモニタリングの強化に伴い、平日に採水して 3 ヶ月間貯水した蛇口水のガンマ線放出核種分析および 1 ヶ月ごとの地上 1m の高さにおけるサーベイメータによる空間放射線量率の測定を引き続き行った。

キーワード：環境放射能、全ベータ放射能、核種分析、空間放射線量率

Key words: environmental radioactivity, gross β activity, radionuclide analysis, environmental γ activity

当所では、昭和 35 年（1960 年）度より大阪府における環境および食品中の放射能測定調査を実施している。この調査は、人工放射性降下物および原子力施設等からの放射性物質の漏洩による環境汚染の有無およびそのレベルを明らかにする目的で行っており、主として原子力規制庁の委託によるものである。

降水（雨水）については全ベータ放射能測定、その他の環境試料および食品試料についてはガンマ線核種分析 [セシウム 134 (^{134}Cs)、セシウム 137 (^{137}Cs)、ヨウ素 131 (^{131}I)、カリウム 40 (^{40}K) 等] を行った。

また、モニタリングポストに関しては平成 24 年度より、平成 23 年 3 月に発生した福島第 1 原子力発電所

の事故を受けて増設された 5 ヶ所(茨木市、寝屋川市、東大阪市、富田林市、泉佐野市)に既設の大阪市を加えた 6 ヶ所において調査を行っている。

ガンマ線核種分析に関しては、測定値の信頼性確保のため、(公財)日本分析センターとの間で、既知量の放射性核種を添加した試料 7 検体について、クロスチェック（標準試料法による相互比較分析）を行った。

さらに、平成 23 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震により発生した福島第 1 原子力発電所の事故を受け、モニタリング強化として、平日に上水（蛇口水）を採取し 3 ヶ月間貯水した蛇口水のガンマ線核種分析を行い、毎月第 2 週の水曜日にはサーベイメータによる地上 1m の高さにおける空間放射線量率調査を行った。

本報告では、平成 26 年度に実施した上記の放射能調査結果を、過去の測定結果との比較も含め報告する。

* 大阪府立公衆衛生研究所 衛生化学部 生活環境課

Survey of Environmental and Food Radioactivity in Osaka Prefecture
(Fiscal 2014 Report)

by Emiko AZUMA, Toshie HIZUKA and Shin-ichi ADACHI

表1 放射能調査項目および試料等

調査項目	試料名	種別	採取場所	採取回数等	件数
全ベータ放射能	定時降水	雨水	大阪市東成区 当所屋上	降雨毎	
ガンマ線核種分析	大気浮遊じん		大阪市東成区 当所屋上	3ヶ月毎	4
	降下物	雨水・ちり	大阪市東成区 当所屋上	毎月	12
	上水	原水 蛇口水	守口市大庭町 大阪府庭窪浄水場 大阪市東成区 当所本館1F	年1回(平成26年6月) 年1回(平成26年6月)	1 1
	海水	表面水	大阪港入口	年1回(平成26年7月)	1
	海底土	表層	大阪港入口	年1回(平成26年7月)	1
	土壌	0~5cm 5~20cm	大阪市中央区 大阪城公園内 大阪市中央区 大阪城公園内	年1回(平成26年8月) 年1回(平成26年8月)	1 1
	牛乳	原乳(生産地)	大阪府羽曳野市	年1回(平成26年8月)	1
	野菜	タマネギ(生産地) キャベツ(生産地)	大阪府泉南郡熊取町 大阪府泉南郡熊取町	年1回(平成26年6月) 年1回(平成27年1月)	1 1
	相互比較分析試料	模擬牛乳 模擬土壌 寒天	(公財)日本分析センターで調製 (公財)日本分析センターで調製 (公財)日本分析センターで調製	年1回(平成26年8月) 年1回(平成26年8月) 年1回(平成26年8月)	1 1 5
	モニタリング強化 (福島第1原発事故)	上水	蛇口水(3ヶ月)	大阪市東成区 当所本館1F	3ヶ月毎
空間線量率	モニタリングポスト		大阪市東成区 当所屋上	毎日/年間	365
			茨木市大住町 茨木保健所	毎日/年間	365
			寝屋川市八坂町 寝屋川保健所	毎日/年間	365
			東大阪市西岩田 東大阪市環境衛生検査センター	毎日/年間	365
			富田林市寿町 富田林保健所	毎日/年間	365
		泉佐野市羽倉崎 市立佐野中学校	毎日/年間	365	
モニタリング強化 (福島第1原発事故)	サーベイメータ		大阪市東成区 当所中庭	毎月	12

実験方法

試料の採取、処理および測定は、「環境放射能水準調査委託実施計画書(平成26年度)」¹⁾に基づいて行った。表1に調査項目および試料等を示す。

1. 全ベータ放射能測定

1-1 降水(雨水)試料

当所(大阪府立公衆衛生研究所:大阪市東成区)観測室屋上(地上約20m)に設置したデポジットゲージ(表面積1000cm²)で雨水を集めた。毎朝9時30分に採取し、100mL(1mm)以上の降水があった場合には100mLを測定試料とした。

1-2 測定方法

蒸発皿に試料100mLとヨウ素担体(1mg I⁻/mL)1mL、0.1mol/L硝酸銀1mLおよび10%硝酸1mLを加えて加熱濃縮させた。濃縮物を直径25mmのステンレス製試料皿に移して蒸発乾固させ、測定用試料とした。測定は低バックグラウンド放射能自動測定装置(キャンベラ製、S5X2050E型)で行った。比較試料は、酸化ウラン(U₃O₈:日本アイソトープ協会製、35.3dps)を用いた。測定は試料採取から6時間後に行った。測定時間は、比較試料5分、降水試料30分とした。

2. 核種分析

2-1 測定試料

(1) 大気浮遊じん: 当所観測室屋上(地上約20m)に設置したハイボリウム・エアサンプラー(柴田科学株式会社製、HV-1000R)を用いて、ろ紙(東洋濾紙、HE-40T)上に大気浮遊じんを捕集した。毎月3回、午前10時から翌日の午前10時までの24時間捕集を行った。3ヶ月分のろ紙試料(測定に供した吸引量:約10000m³)をカッターで円形(直径50mm)に切り取り、ポリプロピレン製容器(U-8容器)に詰め測定用試料とした。

(2) 降下物(雨水・ちり): 当所観測室屋上(地上約20m)に設置した水盤(表面積5000cm²)に降下した雨水およびちりを1ヶ月間採取し、採取した試料全量を上水自動濃縮装置(柴田理化工機製)を用いて蒸発濃縮させた。濃縮物を蒸発皿に移して蒸発乾固させた後、残留物をU-8容器に移し測定用試料とした。

(3) 上水: 原水(淀川河水)は大阪府庭窪浄水場(守口市)原水取水口から、蛇口水は当所本館1階の実験室内蛇口から採取した。採取試料各100Lを上水自動濃縮装置を用いて蒸発濃縮させた。濃縮物を蒸発皿に移して蒸発乾固させた後、残留物をそれぞれU-8容器に移し測定用試料とした(時期および測定数は表1を参照)。

(4) **食品**：牛乳 5L のうち、2L をマリネリビーカー (2L 容) に入れ測定用試料とした。残りの 3L を石英製容器に入れて IH 調理器 (Panasonic 製、KZ-PH5P) で濃縮させた後、電気炉 (450℃) で灰化した。野菜類の食用部約 4kg は 65℃ の乾燥器で乾燥させた後に、石英製容器に移して電気炉 (450℃) で灰化した。それぞれの灰試料は 0.35mm メッシュのふるいに通し、U-8 容器に移して測定用試料とした (試料採取場所、時期および測定数は表 1 を参照)。

(5) **海水、土壌、海底土**：2L の海水をマリネリビーカー (2L 容) に入れ、測定用試料とした。土壌および海底土は、採取後に 105℃ の乾燥器で乾燥させた後、2mm メッシュのふるいに通して得られた乾燥細土約 100g を U-8 容器に入れ、測定用試料とした (試料採取場所、時期および測定数は表 1 を参照)。

(6) **標準試料法による相互比較分析**：(公財) 日本分析センターが数核種を添加して調製した放射能標準容積線源 (寒天) (以下「寒天」という) および放射能標準容積線源 (模擬土壌 (アルミナ)) (以下「模擬土壌」という) ならびに分析比較試料 (模擬牛乳) (以下「模擬牛乳」という) について、寒天 (U-8 容器：5 試料) および模擬土壌 (U-8 容器：1 試料) は U-8 容器のまま、模擬牛乳 (1 試料) は全量 (2L) をマリネリビーカー (2L 容) に入れ測定を行った。

測定結果については、(公財) 日本分析センターにおいて基準値 (添加値) と比較し評価を行った。評価は、当所 (分析機関) の分析値と基準値の拡張不確かさ (U) から En 数を算出し、 $|En| \leq 1$ を基準値内 (基準値と一致) とした。なお、 En 数は下記の式により求められる。

$$En \text{ 数} = \frac{(\text{分析値}_{\text{分析機関}} - \text{基準値})}{\sqrt{U^2_{\text{分析機関}} + U^2_{\text{基準値}}}}$$

2-2 測定方法

あらかじめエネルギーの異なる核種を含んだ標準線源を用いてエネルギー校正および検出効率校正を行ったゲルマニウム半導体検出器 (キャンベラ製、GC2018) を用い、試料中の核種より放出されるガンマ線量を測定した。測定時間は原則 80000 秒とし、寒天のみ 20000 秒から 80000 秒とした。得られた計測結果をバックグラウンド補正した後、エネルギー補正および検出効率

補正を行ない、測定試料中の核種 (^{134}Cs 、 ^{137}Cs 、 ^{131}I および ^{40}K 等) の定性定量分析を行った。

3. 空間放射線量率測定

モニタリングポスト (NaI シンチレーション式、エネルギー補償型、アロカ製 MAR-22 型) による空間放射線量率の測定は、当所観測室屋上に設置したモニタリングポスト (地上約 20m) に、茨木市、寝屋川市、東大阪市、富田林市、泉佐野市に設置した 5 基 (地上 1m) を加えた 6 基で連続測定を行った (設置場所は表 1 を参照)。結果は 1 時間平均値による 1 日の変動をメモリーカードから読み取った。

なお、モニタリングポスト 6 基の測定結果は、自動測定・配信システムにより 10 分間の平均値が原子力規制委員会のホームページにリアルタイムで公表されている (<http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/>)。

4. 福島第 1 原子力発電所の事故によるモニタリング強化

4-1 ゲルマニウム半導体検出器を用いた核種分析

(1) 測定試料

1) **上水 (蛇口水)**：平成 24 年 1 月以降、土、日、祝日を除く平日に、当所本館 1 階の実験室内蛇口から採水した上水をメスシリンダーで 1.5L づつ量り取った。貯水した 3 ヶ月分 (約 90L) の上水を上水自動濃縮装置を用いて蒸発濃縮させた。蒸発皿に濃縮物に移して蒸発乾固させた後、残留物を U-8 容器に移し測定用試料とした。

(2) 測定方法

2-2 と同様の方法でガンマ線核種分析を行った。測定時間は 80000 秒とした。

4-2 サーベイメータによる空間放射線量率調査

平成 24 年 1 月以降、毎月第 2 週の水曜日の午前 10 時に当所中庭においてサーベイメータ (NaI シンチレーション式、アロカ製 TCS-171B 型) で空間放射線量率を測定した。測定は、「環境放射能水準調査委託実施計画書 (平成 20 年 7 月)」²⁾ に準じて行った。測定器の時定数を 30 秒とし、地表 1m の高さにおけるサーベイメータの指示値を 30 秒間隔で 5 回以上読み取り、平均値を算出した。但し、原子力規制庁の指示により上記計画書で加えることとなっている宇宙線による線量率 30 nGy/h は、加えていない。

結果および考察

1. 全ベータ放射能

表2に降水中の全ベータ放射能測定値を示す。

降水中の全ベータ放射能は、85試料中20例から検出されたが、異常値は検出されなかった。

表2 降水中全ベータ放射能測定結果

年 月	降水量 mm	件数 (検出数)	濃度 Bq/L	月間降下量 MBq/km ²
平成26年 4月	74	4(0)	ND	ND
平成26年 5月	71	5(1)	ND~0.31	0.67
平成26年 6月	87	9(2)	ND~0.45	13.8
平成26年 7月	75	7(2)	ND~0.46	3.3
平成26年 8月	316	9(2)	ND~0.40	0.94
平成26年 9月	93	5(2)	ND~0.42	2.4
平成26年 10月	118	6(1)	ND~0.39	0.67
平成26年 11月	55	4(1)	ND~0.30	7.2
平成26年 12月	78	9(1)	ND~0.40	0.52
平成27年 1月	99	11(4)	ND~0.51	6.6
平成27年 2月	32	8(3)	ND~1.11	2.4
平成27年 3月	172	8(1)	ND~0.36	2.5
平成26年度	1270	85(20)	ND~1.11	41.0
過去3年間の値				
平成23年度 ¹⁾	1637	17(2)	ND~0.5	17.1
平成24年度 ²⁾	1473	81(8)	ND~1.1	47.8
平成25年度	1424	82(8)	ND~0.9	13.1

ND：計数値がその計数誤差の3倍を下回るもの

- 1)：福島第1原子力発電所事故に伴うモニタリング強化のため、平成23年4月～12月まで休止。
2)：北朝鮮核実験に伴うモニタリング強化のため、平成25年2月13日～22日まで休止。

2. 核種分析

環境試料および食品試料中の¹³⁴Cs、¹³⁷Cs、¹³¹Iおよび⁴⁰Kの分析結果を表3に示す。

(1) ¹³⁴Csおよび¹³⁷Cs：今年度も例年同様、¹³⁷Csが土壌、海底土の各試料から検出されたが、そのレベルは過去の値と同程度であった。¹³⁴Csは、どの試料からも検出されなかった。

(2) ¹³¹I：¹³¹Iは、上水原水および蛇口水試料から微量（それぞれ2.7および0.66 mBq/L）検出された。他の環境試料および食品試料からは検出されなかった。上水中の¹³¹Iについては、原水が平成元年度から、上水が平成2年度から検出されており、そのレベルも過去の値（原水：0.4～4.9、蛇口水：0.4～1.4mBq/L）³⁾と同程度であることや他の環境試料等から検出されていないこと、半減期が8日と短いことなどから、既報⁴⁾に述べたように、その起源は医学利用によるものであ

らうと推定される。

上水中に存在する¹³¹Iによる府民への健康影響については、既報⁴⁾でも論じたように、そのレベルは「飲食物の摂取制限に関する指標⁵⁾」（飲料水中¹³¹I濃度：300Bq/kg以上）の30万分の1程度の低値であり、問題はないと考えられる。

(3) ⁴⁰K：天然放射性核種である⁴⁰Kレベルは過去の値と同程度であり、特に異常値は認められなかった。

(4) 標準試料法による相互比較分析：(公財)日本分析センターの報告書によると、当所の分析結果は基準値（添加値）とよく一致しており、かつ、En数も「1」以下であり、ガンマ線核種分析の精度は確保されている事が認められた。

3. 空間放射線量率

モニタリングポストによる空間放射線量率調査の結果を表4-1から表4-6に示す。

表4-1に示す大阪市の空間放射線量率値の1時間平均値に基づく1日の変動は、年間を通じて40～62 nGy/hで平常値の範囲であり、過去3年間の結果と同程度であった。

表4-2に示す茨木市の空間放射線量率値の1時間平均値に基づく1日の変動は、年間を通じて53～92 nGy/hの範囲であり、過去2年間の結果と同程度であった。

表4-3に示す寝屋川市の空間放射線量率値の1時間平均値に基づく1日の変動は、年間を通じて70～103 nGy/hの範囲であり、過去2年間の結果と同程度であった。

表4-4に示す東大阪市の空間放射線量率値の1時間平均値に基づく1日の変動は、年間を通じて75～103 nGy/hの範囲であり、過去2年間の結果と同程度であった。

表4-5に示す富田林市の空間放射線量率値の1時間平均値に基づく1日の変動は、年間を通じて61～87 nGy/hの範囲であり、過去2年間の結果と同程度であった。

表4-6に示す泉佐野市の空間放射線量率値の1時間平均値に基づく1日の変動は、年間を通じて48～105 nGy/hの範囲であり、過去2年間の結果と同程度であった。

表3 環境および食品試料中の¹³⁴Cs、¹³⁷Cs、¹³¹Iおよび⁴⁰K濃度

試料	採取年月日	単位	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	⁴⁰ K
大気浮遊じん						
平成26年 4月～6月	H26.4.7 ～ H26.6.18	mBq/m ³	ND	ND	ND	0.37±0.043
7月～9月	H26.7.8 ～ H26.9.17	〃	ND	ND	ND	0.27±0.040
10月～12月	H26.10.6 ～ H26.12.16	〃	ND	ND	ND	0.24±0.039
平成27年 1月～3月	H27.1.7 ～ H27.3.17	〃	ND	ND	ND	0.26±0.039
平成26年度		mBq/m ³	ND	ND	ND	0.24～0.37
過去3年間の値		mBq/m ³	ND～0.63	ND～0.68	ND	0.19～0.32
降下物						
平成26年 4月	H26.4.1 ～ H26.5.1	MBq/km ²	ND	ND	ND	0.74±0.18
平成26年 5月	H26.5.1 ～ H26.6.2	〃	ND	ND	ND	0.99±0.19
平成26年 6月	H26.6.2 ～ H26.7.1	〃	ND	ND	ND	ND
平成26年 7月	H26.7.1 ～ H26.7.31	〃	ND	ND	ND	ND
平成26年 8月	H26.7.31 ～ H26.9.1	〃	ND	ND	ND	0.66±0.18
平成26年 9月	H26.9.1 ～ H26.10.1	〃	ND	ND	ND	0.78±0.17
平成26年 10月	H26.10.1 ～ H26.10.31	〃	ND	ND	ND	0.55±0.17
平成26年 11月	H26.10.31 ～ H26.12.2	〃	ND	ND	ND	0.81±0.18
平成26年 12月	H26.12.2 ～ H27.1.5	〃	ND	ND	ND	0.61±0.18
平成27年 1月	H27.1.5 ～ H27.2.2	〃	ND	ND	ND	ND
平成27年 2月	H27.2.2 ～ H27.3.2	〃	ND	ND	ND	ND
平成27年 3月	H27.3.2 ～ H27.4.1	〃	ND	ND	ND	0.91±0.19
平成26年度		MBq/km ²	ND	ND	ND	ND～0.99
過去3年間の値		MBq/km ²	ND～8.3	ND～7.9	ND	ND～1.9
上水・原水	H26.6.20	mBq/L	ND	ND	2.7±0.19	76±2.5
過去3年間の値		mBq/L	ND～0.33	ND～0.23	1.0～3.8	76～96
上水・蛇口水	H26.6.16	mBq/L	ND	ND	0.66±0.11	81±2.5
過去3年間の値		mBq/L	ND	ND	ND～0.63	60～76
上水・蛇口水(モニタリング強化)						
平成26年 4～6月	H26.4.1 ～ H26.6.30	mBq/L	ND	ND	ND	79±2.6
7～9月	H26.7.1 ～ H26.9.30	mBq/L	ND	ND	ND	81±2.6
10～12月	H26.10.1 ～ H26.12.26	mBq/L	ND	ND	ND	86±2.8
平成27年 1～3月	H27.1.5 ～ H27.3.31	mBq/L	ND	ND	ND	75±2.6
平成26年度		mBq/L	ND	ND	ND	75～86
過去2年間の値		mBq/L	ND	ND	ND	64～84
海水	H26.7.1	Bq/L	ND	ND	ND	6.8±0.42
過去3年間の値		Bq/L	ND	ND	ND	3.8～5.4
海底土	H26.7.1	Bq/kg dry	ND	1.3±0.23	ND	630±11
過去3年間の値		Bq/kg dry	ND	2.0～2.2	ND	620～670
土壌	H26.8.7	Bq/kg dry	ND	1.9±0.28	ND	730±11
0～5cm層		(MBq/km ²)	(ND)	(89±13)	(ND)	(34400±500)
過去3年間の値		Bq/kg dry	ND	0.98～2.0	ND	650～680
		(MBq/km ²)	(ND)	(49～85)	(ND)	(28000～34000)
土壌	H26.8.7	Bq/kg dry	ND	3.9±0.25	ND	670±10
5～20cm層		(MBq/km ²)	(ND)	(580±37)	(ND)	(100000±1460)
過去3年間の値		Bq/kg dry	ND	2.8～3.5	ND	660～670
		(MBq/km ²)	(ND)	(450～530)	(ND)	(100000～110000)
牛乳 原乳	H26.8.20	Bq/L	ND	ND	ND	48±0.94
過去3年間の値		Bq/L	ND	ND	ND	48～49
農産物 タマネギ	H26.6.30	Bq/kg生	ND	ND	ND	45±0.35
過去3年間の値		Bq/kg生	ND	ND	ND	41～45
農産物 キャベツ	H27.1.20	Bq/kg生	ND	ND	ND	71±0.47
過去3年間の値		Bq/kg生	ND	ND	ND	72～95

ND:計数値がその計数誤差の3倍を下回るもの

表4-1 モニタリングポストによる空間放射線量率
(大阪市 府立公衆衛生研究所：地上20m)

測定年月	測定回数	モニタリングポスト(nGy/h) (所在地：大阪市)		
		最高値	最低値	平均値
平成26年 4月	30	52	41	42
同 5月	31	56	41	43
同 6月	30	54	41	42
同 7月	31	50	41	42
同 8月	31	62	40	42
同 9月	30	48	41	42
同 10月	31	59	41	43
同 11月	30	56	42	43
同 12月	31	57	41	43
平成27年 1月	31	54	40	42
同 2月	28	51	40	42
同 3月	31	57	40	42
平成26年度	365	62	40	42
過去3年間の値				
平成23年度	366	66	41	43
平成24年度	365	71	41	43
平成25年度	365	63	41	43

表4-2 モニタリングポストによる空間放射線量率
(茨木市 茨木保健所：地上1m)

測定年月	測定回数	モニタリングポスト(nGy/h) (所在地：茨木市)		
		最高値	最低値	平均値
平成26年 4月	30	65	55	57
同 5月	31	84	55	57
同 6月	30	74	54	58
同 7月	31	71	55	58
同 8月	31	90	53	56
同 9月	30	92	54	57
同 10月	31	80	54	57
同 11月	30	79	55	57
同 12月	31	81	54	56
平成27年 1月	31	86	53	56
同 2月	28	71	53	55
同 3月	31	92	54	56
平成26年度	365	92	53	57
過去2年間の値				
平成24年度	365	93	54	57
平成25年度	365	88	53	57

表4-3 モニタリングポストによる空間放射線量率
(寝屋川市 寝屋川保健所：地上1m)

測定年月	測定回数	モニタリングポスト(nGy/h) (所在地：寝屋川市)		
		最高値	最低値	平均値
平成26年 4月	30	79	71	72
同 5月	31	86	70	72
同 6月	30	85	71	72
同 7月	31	97	70	72
同 8月	31	101	70	72
同 9月	30	102	70	72
同 10月	31	91	71	72
同 11月	30	85	70	72
同 12月	31	92	71	72
平成27年 1月	31	103	70	72
同 2月	28	84	70	72
同 3月	31	95	70	72
平成26年度	365	103	70	72
過去2年間の値				
平成24年度	365	110	70	73
平成25年度	365	92	70	72

表4-4 モニタリングポストによる空間放射線量率
(東大阪市 東大阪市環境衛生検査センター：地上1m)

測定年月	測定回数	モニタリングポスト(nGy/h) (所在地：東大阪市)		
		最高値	最低値	平均値
平成26年 4月	30	95	76	78
同 5月	31	95	76	79
同 6月	30	89	76	79
同 7月	31	96	76	78
同 8月	31	103	75	78
同 9月	30	90	76	79
同 10月	31	99	76	79
同 11月	30	94	76	79
同 12月	31	102	76	78
平成27年 1月	31	103	76	78
同 2月	28	93	76	78
同 3月	31	100	76	79
平成26年度	365	103	75	78
過去2年間の値				
平成24年度	365	122	75	79
平成25年度	365	112	75	79

表4-5 モニタリングポストによる空間放射線量率
(富田林市 富田林保健所：地上1m)

測定年月	測定回数	モニタリングポスト(nGy/h) (所在地：富田林市)		
		最高値	最低値	平均値
平成26年 4月	30	77	62	63
同 5月	31	79	62	63
同 6月	30	79	62	63
同 7月	31	76	61	63
同 8月	31	77	61	63
同 9月	30	68	61	63
同 10月	31	87	61	63
同 11月	30	78	61	63
同 12月	31	82	61	63
平成27年 1月	31	84	61	63
同 2月	28	77	61	63
同 3月	31	83	61	63
平成26年度	365	87	61	63
過去2年間の値				
平成24年度	365	93	61	63
平成25年度	365	82	60	63

表4-6 モニタリングポストによる空間放射線量率
(泉佐野市 佐野中学校：地上1m)

測定年月	測定回数	モニタリングポスト(nGy/h) (所在地：泉佐野市)		
		最高値	最低値	平均値
平成26年 4月	30	69	49	51
同 5月	31	74	49	51
同 6月	30	68	49	52
同 7月	31	69	49	51
同 8月	31	84	48	51
同 9月	30	65	49	51
同 10月	31	105	49	52
同 11月	30	65	49	51
同 12月	31	73	49	51
平成27年 1月	31	88	49	51
同 2月	28	68	49	51
同 3月	31	80	49	52
平成26年度	365	105	48	51
過去2年間の値				
平成24年度	365	94	49	51
平成25年度	365	77	48	51

4. 福島第1原子力発電所の事故によるモニタリング強化

(1) ゲルマニウム半導体検出器を用いた核種分析

平日に上水（蛇口水）を採取し3ヶ月間貯水して測定した結果を表3の中に示した。

3ヶ月貯水した蛇口水からは、人工放射性核種は検出されなかった。

(2) サーベイメータによる空間放射線量率調査

当所中庭で行った測定の結果を表5に示す。

表5 サーベイメータによる空間放射線量率
(地上1m、当所中庭)

測定年月	サーベイメータ (nGy/h)	
	測定回数	測定値
平成26年 4月	1	75
同 5月	1	77
同 6月	1	80
同 7月	1	77
同 8月	1	74
同 9月	1	79
同 10月	1	77
同 11月	1	71
同 12月	1	66
平成27年 1月	1	76
同 2月	1	70
同 3月	1	79
平成26年度	12	75
過去の値		
平成25年度	12	74~88(平均:78)
平成8~20年度	156	77~108(平均:92)

当所中庭での値は、測定期間中 66~80 nGy/h の範囲であり、同じ場所で測定していた過去の値（平成8年度~20年度）から見て平常値の範囲内であった。

ま と め

核種分析により人工放射性核種である ^{131}I および ^{137}Cs が検出された。医学利用等に由来すると考えられる ^{131}I は上水（原水および蛇口水）に極低レベルで検出された。 ^{137}Cs は土壌や海底土から例年と同様に検出されたが、そのレベルは低値であった。また、他の人工放射性核種はいずれの試料からも検出されなかった。空間放射線量率値にも異常値は検出されなかった。

福島第1原子力発電所事故によるモニタリング強化で実施された、サーベイメータによる空間放射線量率調査は、例年とほぼ同じ範囲内であった。また、ゲル

マニウム半導体検出器を用いた核種分析調査でも人工放射性核種は検出されなかった。

本調査の遂行にあたり、調査試料の採取にご協力いただきました大阪市ゆとりとみどり振興局東部方面公園事務所、熊取町役場、大阪府環境農林水産総合研究所、大阪府広域水道企業団庭窪浄水場の各機関に感謝致します。また、調査実施にあたり、ご指導をいただきました原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室、日本分析センターならびに大阪府庁健康医療部環境衛生課の皆様に謝意を表します。

注：本報告は、電源開発促進対策特別会計法に基づく原子力規制庁からの受託事業として、大阪府立公衆衛生研究所が実施した平成26年度「環境放射能水準調査」の成果です。

文 献

- 1) 原子力規制庁 監視情報課放射線環境対策室：環境放射能水準調査委託実施計画書、平成26年度
- 2) 文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課防災環境対策室：環境放射能水準調査委託実施計画書、平成20年7月
- 3) 肥塚利江，東恵美子，足立伸一：大阪府における環境および食品中放射能調査（平成25年度報告），大阪府立公衛研所報，第52号，67-74（2014）
- 4) 田村幸子，渡辺功，布浦雅子：大阪府における環境および食品中放射能調査，一平成元年4月~平成2年3月一，大阪府立公衛研所報，公衆衛生編，第28号，165-170（1990）
- 5) 原子力施設等の防災対策について（昭和55年6月，原子力安全委員会，平成22年8月改訂），5-3（3）